

منشأ متداول سرب

برنامه پیشگیری از مسمومیت با سرب در دوران کودکی ویرجینیا
(Virginia Childhood Lead Poisoning Prevention Program)

قرار گرفتن در معرض سرب اغلب در خانه و اطراف آن اتفاق می‌افتد. بزرگسالان با سرگرمی‌ها و حرفه‌های خاص نیز ممکن است ذرات سرب را بر روی لباس و کفش خود به خانه بیاورند. **فهرست زیر شامل برخی از منابع رایج قرار گرفتن در معرض سرب است:**

منابع قابل بلع



- ادویه جات وارداتی، به ویژه:
 - کاری، ماسالا، زردچوبه، پودر فلفل قرمز، زیره سبز، گشنیز، دارچین
 - کویتلی کوآوالی (Kviteli kvavali)، سوانوری ماریلی (svanuri marili)، تمبر هندی (adjika)، آجیکا (tamarind)
- داروهای خانگی سنتی و لوازم آرایشی، از جمله:
 - بابواسان، داوتوای، گرتا، آذرکون، گاسارد، پیلوا، بالی گلیا، کاندو (Ba-baw-san, Daw Tway, Greta, Azarcon, Ghasard, Paylooah, Bali Gholia, Kandu)
 - سیندور، کوهل، کاجال، سورما (Sindoor, Kohl, Kajal, Surma)
- آب‌نیات‌های وارداتی و بسته بندی‌های آن‌ها

منشأ زیست محیطی



- رنگ بر پایه سرب
- خاک مجاور جاده یا نزدیک خانه قدیمی
- رنگ‌آمیزی با رنگ‌های بر پایه سرب
- آب لوله‌کشی‌های حاوی سرب
- پرده‌های مینی وینیل
- اسباب‌بازی‌های وارداتی یا عتیقه کودکان
- سفال و سرامیک با لعاب سرب
- جواهرات وارداتی

منابع سرگرمی



- وزنه و طعمه‌های ماهیگیری
- گلوله و ساچمه
- شیشه‌های رنگ آمیزی شده یا سایر شیشه‌کاری‌ها
- بازسازی مبلمان
- لعاب یا ساخت سفال / سرامیک
- تیراندازی به هدف در محدوده تیراندازی
- ساخت جواهرات

منشأ شغلی



- نوسازی یا بازسازی ساختمان
- ساخت و ساز یا تخریب
- معدنکاری یا فلزکاری
- دستورالعمل محدوده تیراندازی
- تولید پلاستیک یا لاستیک
- جوشکاری یا برشکاری
- تعمیر و ساخت بدنه خودرو
- ریخته‌گری یا لحیم کاری



اگر فکر می‌کنید کودک شما از طریق هر یک از این منابع در معرض سرب قرار گرفته است، از ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود بخواهید که آزمایش سرب خون را برای وی انجام دهد.

